

Pinaikling Pagitan ng Karagdagang Bakuna at Rekomendasyon ng Bakunang Pfizer para sa mga 30 Taon Gulang Pababa

Pinaikli ang pagitan ng karagdagang(booster shot) pagbabakuna sa pagsasaalang-alang sa panganib at malubhang kamatayan

Mga karapat dapat	Inirerekomendang pagitan ng bakuna	
	Kasalukuyan	Pagbabago
60 taong gulang pataas Mga taong pumasok at nagtatrabaho sa isang pasilidad na madaling mahawa ¹⁾ Nursing hospital·Naka-admit sa pasilidad·Pumasok·Manggagawa Pasyenteng may pinag-uugatang sakit(18-59taong gulang) Mga mang-gagawa ng mga institusyong medikal tulad ng mga ospital at klinika atbp	6 na buwan	4 na buwan
50's Priyoridad ng pagbabakuna Pangkat ng trabahador ²⁾	6 na buwan	5 buwan
Mga nabakunahan ng Janssen Vaccine Mga mahihina ang immune system ³⁾	2 buwan	2buwan (walang pagbabago)

- 1) Pasilidad para sa mga Matatanda(Paninirahan,Araw/Gabi/Panandaliang pangangalaga), Pasilidad para sa may mga kapansanan(Paninirahan/Pag-aalaga sa araw), Elderly Care Community Living Family, Pasilidad para sa mga may tuberculosis·Hansen's residence facility, Mga naninirahang taong walang tirahan at mga ginagamit na pasilidad
- 2) Sundalo, Pulis, Bumbero, Coast Guard, Health care worker, Mga tauhang nars para sa mga espesyal na pangangalaga sa bata at Daycare center, Guro sa espesyal na edukasyon at Pampublikong kalusugan, Mga mang-gagawa sa koreksyonal, atbp, at mga mang-gagawa sa paliparan atbp.

3) Malalang lukemya, mga pasyenteng sumasailalim sa immunosuppressive na gamutan atbp.

○ **Ang mga kwalipikado ay maaring magpareserba sa COVID19 reservation website**(<https://ncvr.kdca.go.kr>) mula 2linggo bago ang iyong pagbabakuna(pagkalipas ng 11.22)(Lunes)

* Makalipas ang Desyembre 16 (Lunes) ay maaring pumili ng sariling araw ng pagbakuna.

○ Kapag dumating ang oras ng reserbasyon ay makakatanggap ang mga indibidwal ng mensahe para sa mga maaring tumanggap at paraan ng pagre-reserba.

□ 30 Taong Gulang Pababa (Ipinanganak matapos ang Enero 1, 1992) Pfizer ang rekomandang batayang bakuna (1st - 2nd dosis)

○ Sa ilang mga bansa, ang insidente ng myocarditis at pericarditis mula sa Moderna na bakuna ay mataas kaysa sa Pfizer na bakuna kaya nagsagawa ng mga paunang tugon.

□ Ang pagtatasa ng panganib ng COVID19 dahil sa hakbang ng panumbalik ng new normal na pamumuhay

○ Mga hakbang tulad ng pagpapatupad ng panumbalik ng new normal na pamumuhay o mga planong pang-emerhensya ayon sa komprehensibong pagtatasa ng panganib para sa iba't ibang indicator, na tumutuon sa mga kakayahan sa pagtugon sa medikal.

○ Lingguhang pagsusuri at pagpapasya kung ipapatupad ang new normal na pamumuhay pagkatapos ng 4 na linggo ng pagsusuri sa yugto

<Isinalin ng Danuri Call Center 1577-1366>