

ការកាត់បន្ថយរបៀបពេលវេលា ចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែម និងណែនាំវ៉ាក់សាំងហ្វាយស៊ីរ សម្រាប់អាយុក្រោម៣០ឆ្នាំ

☐ ការកាត់បន្ថយរបៀបពេលវេលាចាក់ថ្នាំបង្ការ ការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែម(ដូសជំរុញ) ដោយមានការពិចារណាលើហានិភ័យនៃការស្លាប់ធ្ងន់ធ្ងរ

ក្រុមត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំង	ណែនាំចន្លោះរបៀបពេលវេលាចាក់វ៉ាក់សាំង	
	អនុវត្ត បច្ចុប្បន្ន	ផ្លាស់ប្តូរ
អាយុ៦០ឆ្នាំឡើង	៦ខែ	៤ខែ
បុគ្គលិកអាជីព និងអ្នកចូលស្នាក់នៅកន្លែងងាយនឹងឆ្លងមេរោគ ^{១)}		
បុគ្គលិក មន្ទីរពេទ្យថែទាំចាស់ជរា, កន្លែងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ, កន្លែងស្នាក់បណ្តោះអាសន្ន, បុគ្គលិកអាជីព		
អ្នកជំងឺមូលដ្ឋាន(អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ ដល់៥៩ឆ្នាំ)		
បុគ្គលិកនៃស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ ដូចជាមន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិក	៦ខែ	៥ខែ
អាយុខ្ពង់៥០ឆ្នាំ		
ថ្នាក់នៃការងារ អ្នកមានអាទិភាពទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេ ^{២)}	២ខែ	២ខែ (គ្មានការផ្លាស់ប្តូរ)
អ្នកចាក់ថ្នាំបង្ការ ប្រភេទវ៉ាក់សាំងយ៉ានសិន		
អ្នកដែលមានប្រពន្ធភាពសុំខ្សោយ ^{៣)}		

១) កន្លែងស្នាក់នៅចាស់ជរា(កន្លែងស្នាក់នៅ, ថ្ងៃ/យប់/ការការពាររបៀបពេលវេលាខ្លី), កន្លែងស្នាក់នៅជនពិការ(កន្លែងស្នាក់នៅ/ការថែទាំពេលថ្ងៃ), គ្រួសារដែលរស់នៅជាសហគមន៍ថែទាំមនុស្សចាស់, ជំងឺរបេង/កន្លែងស្នាក់-លំនៅឋានអ្នកជំងឺរបេង-ជំងឺយូដ, កន្លែងស្នាក់នៅជនអនាថានិងទីកន្លែងប្រើប្រាស់សម្ភារៈបរិក្ខារ។

២) ទាហាន, ប៉ូលីស, អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ, ឆ្នាំសមុទ្រ, បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ, បុគ្គលិកថែទាំអប់រំ កុមារពិសេស និងមណ្ឌលថែទាំកុមារ, គ្រូបង្រៀនអប់រំពិសេស និងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ, បុគ្គលិកក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ ផ្សេងៗ, អ្នកបម្រើលើយន្តហោះ។ល។

៣) អ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមនិងប្រព័ន្ធភាពសុំ។ល។
 ○ អ្នកដែលអាចទទួលការកក់គឺ អាចធ្វើការកក់ក្រោយ(ចន្លោះ)ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ការកក់ទុកជាមុននូវការចាក់ថ្នាំបង្ការកូវីដ-១៩ តាមគេហទំព័រ <https://ncvr.kdca.go.kr> ចាប់ពី២សប្តាហ៍មុនពេល ចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់សាមីខ្លួនមកដល់។
 * អ្នកអាចជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទចាក់វ៉ាក់សាំងបាន(ក្រោយ)ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ។
 ○ យើងខ្ញុំអាចជូនដំណឹងជាលក្ខណៈបុគ្គលតាមរយៈសារជាអក្សរ ថាមានសិទ្ធិទទួល និងវិធីសាស្ត្រនៃការកក់ទទួលវ៉ាក់សាំងឬទេ នៅពេលការកក់មកដល់។

☐ ការណែនាំនៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំងហ្វាយស៊ីរ អាយុក្រោម៣០ឆ្នាំ(ថ្ងៃកំណើតក្រោយថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩២) និងជាមូលដ្ឋាន(លើកទី១និងទី២)។

○ នៅប្រទេសមួយចំនួនបានឆ្លើយតបថា អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងម៉ូតូណាមានអត្រាកើត ជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូង និង រលាកស្រោមបេះដូងច្រើនជាង បើប្រៀបទៅនឹងអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំងហ្សាយស៊ីរ។

□ ការវាយតម្លៃពីហានិភ័យជំងឺកូវីដ-១៩ យោងតាមការស្តារឡើងវិញមួយជំហានម្តងៗ

○ ផ្ដោតលើសមត្ថភាពឯកទេសឆ្លើយតបផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ វិធានការដំណាក់កាលការស្តារឡើងវិញជាប្រចាំថ្ងៃ ឬ ការអនុវត្តផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់។ល។ ដោយយោងតាមការវាយតម្លៃហានិភ័យជារួមពីតារាងក្រាហ្វិច ផ្សេងៗ

○ ការវាយតម្លៃប្រចាំសប្តាហ៍ និងការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវអនុវត្តការស្តារឡើងវិញជាប្រចាំថ្ងៃ ក្រោយវាយតម្លៃ ដំណាក់កាលនៃរយៈពេល ៤សប្តាហ៍ទេ

<ការបកប្រែនេះ គឺធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទជាន់ខ្ពស់ ១៥៧៧- ១៣៦៦>