

اضافی ویکسین (بوسٹر شائٹس) کے وقفے کو کم کرنا اور 30 سال سے کم عمر اشخاص کیلئے فائزر کے انتخاب کی تجویز

□ سنگین موت کے خطرے کے پیش نظر اضافی ویکسین (بوسٹر شائٹس) کے درمیان وقفے کو کم کرنا

اہداف	تجویز کردہ ویکسین کا وقفہ	
	موجودہ	تبدیلی کے بعد
60 سال سے ڈاؤن		
انفیکشن سے متاثرہ اشخاص کیلئے موجود سہولیات میں داخل ہونے اور کام کرنے والے افراد ¹⁾		
نرسنگ ہسپتال، مریضوں کے داخلے کی سہولیات، داخل ہونے اور کام کرنے والے افراد	6 مہینے	4 مہینے
بنیادی طبی امراض والے مریض (عمر 18 سے 59 سال)		
طبی اداروں، ہسپتالوں اور کلینکوں میں کام کرنے والے		
50 کی دہائی والے		
ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگوانے والے پٹھے ²⁾	6 مہینے	5 مہینے
جینسنین (JANSSEN) ویکسین لگوانے والے		
کم قوت مدافعت والے ³⁾	2 مہینے	2 مہینے (تبدیلی نہیں)

1) بزرگوں کی سہولیات (رہائش، دن / رات / قلیل مدتی نگہداشت)، معذوروں کے لیے سہولیات (رہائش / دن کی دیکھ بھال)، بزرگوں کے لیے نرسنگ ہوم، تپ دق اور ہائین کا علاج کروانے والے مریضوں کے لیے رہائش کی سہولیات، بے گھر افراد کے لیے سہولیات

2) سپاہی، پولیس، فائر فائٹرز، کوسٹ گارڈ، صحت اور طبی عملہ، خصوصی ڈے کیئر اور ڈے کیئر سوسائٹیز، خصوصی تعلیم اور صحت کے اساتذہ، اصلاحی سہولیات وغیرہ، فلائٹ عملہ وغیرہ۔

3) شدید لیوکیمییا اور قوت مدافعت کا علاج کرنے والے مریض وغیرہ۔

° ریزرویشن کروانے کیلئے 19 ویکسین ریزرویشن ویب سائٹ (<https://ncvr.kdca.go.kr>) پر ویکسین لگوانے کے مقررہ وقت سے 2 ہفتے پہلے ریزرویشن کروائیں۔ یہ سہولت (22 نومبر) کے بعد سے دستیاب ہے۔

* ویکسین لگوانے کی تاریخ دسمبر 6 (پیر) کے بعد کی تاریخ منتخب کی جاسکتی ہے۔

° ریزرویشن کا وقت آنے پر، آپ کو اہلیت اور ریزرویشن کرنے کے طریقے کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے انفرادی ٹیکسٹ پیغامات بھیجے جائیں گے۔

□ 30 سال سے کم عمر (1 جنوری 1992 کے بعد پیدا ہونے والے) کیلئے بنیادی (پہلی اور دوسری) ویکسین کے لیے فائزر ویکسین کی تجویز و مشورہ

° کچھ ممالک میں موڈرنا (Moderna) ویکسین سے مایو کارڈائٹس اور پیریکارڈائٹس کے واقعات فائزر (Pfizer) ویکسین سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے قبل از وقت اقدامات کیے جائیں۔

□ روزمرہ کی زندگی کی مرحلہ وار بحالی کیلئے 19 کوئی خطرے کی تشخیص

° طبی رد عمل کی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے مختلف خطرات کی جامع تشخیص کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر بحالی کے مرحلے یا ہنگامی منصوبوں کے نفاذ جیسے اقدامات کی تیاری رکھنا

° ہفتہ وار تشخیص کے بعد اس بارے میں فیصلہ کرنا کہ آیا 4 ہفتوں کی مرحلہ وار تشخیص کے بعد روزمرہ کے معمولات کو زندگی میں لاگو کرنا ہے۔

< یہ ترجمہ Gyeongsangnam-do (کیانسانگ نام دو) ملٹی کلچرل فیملی سپورٹ سنٹر کی طرف سے کیا گیا >